

Hubungan antara Kehamilan Multigravida dengan Hipertensi pada Ibu Hamil di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso

Yuli Dwi Astuti¹⁾, Vitri Dyah Herawati²⁾, Fajar Alam Putra²⁾

Intisari

Latar belakang: Hipertensi pada kehamilan sering terjadi dan merupakan penyebab utama kematian ibu melahirkan, serta memiliki efek serius lainnya saat melahirkan. Salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi kehamilan adalah paritas. Ibu multipara dan kehamilan lebih dari empat kali atau grande multipara bisa menyebabkan beragam komplikasi kehamilan yang akan dialami oleh si ibu, salah satunya hipertensi dalam kehamilan.

Tujuan: Mengetahui hubungan antara kehamilan multigravida dengan hipertensi pada ibu hamil di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.

Metode: Penelitian kuantitatif pendekatan observasional analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sampel sebanyak 36 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di poli kandungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso pada bulan Juli – September 2022. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*. Instrumen menggunakan lembar *checklist* kehamilan lebih dari 1 (multigravida) dan hipertensi kehamilan yang dicatat dari buku rekam medik. Data dianalisis dengan uji *Fisher exact*.

Hasil: Sebanyak 23 orang (63,9%) dengan kehamilan kedua, 9 orang (25%) dengan kehamilan ketiga dan 4 orang (11,1%) dengan kehamilan keempat. Sebanyak 13 orang (36,1%) mengalami hipertensi, dan 23 orang (63,9%) tidak mengalami hipertensi. Hasil uji *Fisher exact* diperoleh nilai $p\text{-value} = 0,279$ ($p > 0,05$).

Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara kehamilan multigravida dengan hipertensi pada ibu hamil di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.

Kata kunci: Hipertensi, kehamilan, multigravida,

1) Mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Sahid Surakarta

2) Dosen Program Studi Keperawatan Universitas Sahid Surakarta

ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN MULTIGRAVIDA PREGNANCY AND HYPERTENSION IN PREGNANT AT RSUD DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Yuli Dwi Astuti¹⁾, Fajar Alam Putra²⁾, Vitri Dyah Herawati²⁾

Background: Hypertension in pregnancy is common and a major cause of maternal death, as well as having other serious effects during childbirth. A risk factor for gestational hypertension is parity. Multiparous mothers with more than four pregnancies or grand multiparas can cause various pregnancy complications, namely hypertension.

Objectives: To determine the correlation between multigravida pregnancy and hypertension in pregnant at RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.

Method: Quantitative research with an analytic observational approach and a cross-sectional approach. A sample of 36 pregnant in the obstetric polyclinic at RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso in July – September 2022. The sampling technique used purposive sampling. The instrument used a checklist sheet for more than 1 pregnancy (multigravida) and gestational hypertension recorded from the medical record book. Data were analyzed by Chi Square test.

Results: 23 people (63.9%) had second pregnancies, 9 people (25%) had third pregnancies, and 4 people (11.1%) had fourth pregnancies. 13 people (36.1%) had hypertension, and 23 people (63.9%) did not have hypertension. The result of the Chi Square test obtained the value $\chi^2_{\text{counts}} = 0.927 < \chi^2_{\text{tables}} 3.8414$ with a significant value of p-value = 0.279 (p > 0.05).

Conclusion: There is no correlation between multigravida pregnancy and hypertension in pregnant at RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.

Keywords: Pregnancy, Multigravida, Hypertension

-
1. Students of Nursing department of Sahid Surakarta University
 2. Lecturer of Nursing department of Sahid Surakarta University

