

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pasien rawat inap di RSUD Simo sebanyak 100 pasien dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara polifarmasi dan potensi interaksi obat ranitidine dengan nilai $p(0,001) < 0,05$.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Responden Penelitian

Pasien dan keluarga diharapkan agar dapat memahami dan mematuhi tata cara dalam mengkonsumsi obat yang diberikan agar dapat menghindari terjadinya interaksi obat sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan penyakit.

5.2.2. Bagi Petugas Kesehatan

Petugas kesehatan khususnya dokter dan tenaga kefarmasian sebaiknya dapat memperhatikan obat yang diresepkan terutama potensi interaksi obat yang akan diberikan untuk mencegah dan mengurangi risiko yang terjadi akibat interaksi obat seperti timbulnya efek samping yang tidak diharapkan.

5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian tentang interaksi obat dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya interaksi obat pada pasien.

