

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dugaan efek samping yang terjadi pada penggunaan obat tunggal di instalasi rawat inap Rumah Sakit UNS periode Januari - Desember 2023 paling banyak dialami pada penggunaan ramipril sebagai obat tunggal, antara lain batuk kering sebanyak 3 kejadian (25%), sesak nafas 1 kejadian (8%), pusing sebanyak 2 kejadian (17%). Sedangkan efek samping pada penggunaan obat kombinasi paling banyak dialami pada amlodipin dan ramipril yaitu batuk kering sebanyak 6 kejadian (15%), pusing sebanyak 8 kejadian (20%), dan sesak nafas sebanyak 1 kejadian (2%).

5.2 Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Saran untuk tenaga kesehatan di Rumah Sakit UNS diharapkan untuk adanya kolaborasi antara dokter, perawat, serta apoteker dalam menentukan efek samping obat pada pasien.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumber atau referensi dalam menulis karya ilmiah bagi peneliti selanjutnya, serta dapat dikembangkan lagi dengan metode lain seperti kuisisioner, dimana pasien dapat mengisi kuisisioner yang telah disiapkan peneliti dengan beberapa

daftar pertanyaan berupa keluhan dan efek samping yang biasanya dialami selama pemakaian obat antihipertensi kemudian dapat menggolongkan keluhan berdasarkan kategori diragukan ESO, dicurigai ESO, mungkin ESO, hingga pasti ESO.

