

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan minum obat pada penderita tuberkulosis paru tahap lanjutan di Puskesmas Kota II Mappi, Provinsi Papua Selatan. Dalam penelitian ini terdapat tiga kategori kepatuhan minum obat menurut *kuesioner Morisky Medication Adherence Scale* (MMAS-8) yaitu kepatuhan tinggi, kepatuhan sedang, dan kepatuhan rendah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil dari 80 responden dapat diambil kesimpulan bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti sebagian besar memiliki kepatuhan minum obat dalam kategori kepatuhan tinggi, yaitu sebanyak 20 responden (25%). Sedangkan masih terdapat responden dengan kepatuhan minum obat rendah sebanyak 43 responden (53,75%) pada kepatuhan minum obat sedang dan 17 responden (21,25%) pada kepatuhan minum obat sedang.

5.2 SARAN

a. Tenaga Kesehatan

Tenaga teknis kefarmasian terutama di puskesmas kota II mappi diharapkan dapat memberi pendidikan kesehatan tentang pentingnya kepatuhan pengobatan tuberkulosis sehingga pengetahuan tentang

bahaya-bahaya dan resiko tuberkulosis lebih meningkat dan kepatuhan pasien dalam pengobatan lebih meningkat.

b. Pasien yang menderita tuberkulosis

Untuk pasien yang menderita tuberkulosis selalu berperan aktif dan mengikuti pengobatan rutin untuk mengonsumsi obat anti tuberkulosis sehingga menurunkan angka resiko komplikasi akibat tuberkulosis



