

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat ADL sebelum Mobilisasi Dini dengan presentase Ketergantungan Berat 29 responden (54.7 %) sedangkan presentase Ketergantungan Sedang 24 responden (45.3 %).
2. Tingkat ADL sesudah Mobilisasi Dini dengan presentase Mandiri 46 responden (86.8 %) sedangkan presentase ketergantungan sedang 7 responden (13.2 %).
3. Hasil dari uji analisis *paired t-test* dengan nilai *sig* sebesar $0.001 < 0.05$. dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa adanya pengaruh mobilisasi dini terhadap tingkat *Activity Daily Living* sebelum di lakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi di ruang Yudistira RSUD Diponegoro Dua Satu Klaten.

A. Saran

1. Bagi Pasien

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi penting melakukan mobilisasi dini awal agar dapat bermanfaat dan menjadi informasi bagi penderita tentang penanganan masalah dari penderita.

2. Bagi RSUD Diponegoro Dua Satu Klaten

Hasil penelitian ini para tenaga kesehatan khusus perawat dapat memberikan penkes tentang mobilisasi pada pasien TURP atau pasien yg mengalami pembedahan RSUD Diponegoro Dua Satu Klaten.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mobilisasi dini terhadap *Activity Daily Living* (ADL) pasien *post* operasi.

4. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Hasil dari penelitaian ini diharapkan untuk dijadikan tambahan kepustakaan dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya mengenai mobilisasi dini terhadap *Activity Daily Living* (ADL) pasien *post* operasi.

