

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Karakteristik responden mayoritas berusia dewasa muda yaitu 21-40 tahun sebanyak 25 responden (78,1%), mayoritas memiliki pendidikan SMA sebanyak 25 responden (78,1%), mayoritas bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 22 responden (68,8%), dan mayoritas anak yang di imunisasi pentabio adalah anak pertama sebanyak 16 responden (50%).
2. Pengetahuan ibu tentang imunisasi pentabio mayoritas memiliki pengetahuan cukup baik sebanyak 21 responden (65,6%).
3. Kecemasan ibu tentang efek imunisasi pentabio mayoritas cemas sedang sebanyak 15 responden (46,9%).
4. Ada hubungan pengetahuan ibu tentang imunisasi pentabio dengan kecemasan ibu terhadap efek pemberian imunisasi dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai korelasi hubungan sebesar 0,566 yang berarti pengetahuan dan kecemasan memiliki hubungan korelasi yang kuat.

B. Saran

1. Bagi rumah sakit
Manajemen rumah sakit sebaiknya memfasilitasi intervensi meningkatkan pengetahuan ibu tentang imunisasi pentabio, serta mengembangkan

intervensi untuk menurunkan kecemasan ibu terhadap efek pemberian imunisasi pentabio. Manajemen rumah sakit juga perlu meningkatkan pengetahuan perawat tentang manfaat imunisasi pentabio dan efek pemberian imunisasi pentabio, serta mengoptimalkan peran perawat sebagai pendidik kesehatan (*health educator*) bagi keluarga pasien.

2. Bagi keluarga

Keluarga perlu mencari informasi tambahan mengenai imunisasi pentabio baik dari petugas kesehatan maupun dari berbagai sumber informasi seperti media cetak dan elektronik.

3. Bagi institusi pendidikan

Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang imunisasi pentabio dan menurunkan kecemasan ibu terhadap efek pemberian imunisasi pentabio.

5. Bagi peneliti

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan intervensi keperawatan mandiri untuk mengatasi masalah pengetahuan tentang imunisasi dan kecemasan ibu tentang efek imunisasi.