

## INTISARI

### PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PELAKSANAAN TERHADAP KEMAMPUAN MENGONTROL HALUSINASI DENGAR PADA PASIEN PARANOID HALUSINASI DENGAR DI RSJD DR. ARIEF ZAINUDIN SURAKARTA

Joni<sup>1</sup>, Atik Aryani<sup>2</sup>, Rif Atiningtyas H<sup>3</sup>

**Latar Belakang:** Halusinasi dengar merupakan salah satu masalah keperawatan jiwa dimana pasien merasakan sensori palsu serupa suara yang tak berwujud. Terdapat 70% pasien skizofrenia yang mengalami halusinasi dengar. Penerapan strategi pelaksanaan merupakan salah satu intervensi keperawatan yang ditujukan untuk mengontrol halusinasi dengar pasien.

**Tujuan:** Mengetahui pengaruh penerapan strategi pelaksanaan terhadap kemampuan mengontrol halusinasi dengar pada pasien *skizofrenia paranoid* halusinasi dengar di RSJD dr. Arief Zainudin Surakarta.

**Metode:** Penelitian ini merupakan jenis penelitian *quasy experiment* dengan rancangan *time series design*. Tempat penelitian di Bangsal Nakula dan Bangsal Sena Rumah Sakit Jiwa dr. Arief Zaenudin Surakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 22 pasien dengan teknik *total sampling*. Alat analisis yang digunakan dengan uji *paired simple t-test*.

**Hasil:** (1) Kemampuan mengontrol halusinasi dengar pada pasien *skizofrenia paranoid* sebelum diterapkan strategi pelaksanaan halusinasi sebagian besar mempunyai kemampuan tergolong mampu yaitu sebanyak 13 orang (59,1%) dan tidak mampu sebanyak 9 orang (40,9); (2) Kemampuan mengontrol halusinasi dengar pada pasien *paranoid* halusinasi dengan sesudah diterapkan strategi pelaksanaan halusinasi sebagian besar mempunyai kemampuan tergolong mampu yaitu sebanyak 16 orang (72,7%) dan yang tidak mempunyai kemampuan mengontrol halusinasi dengar sebanyak 6 orang (27,3%); (3) Kemampuan mengontrol halusinasi dengar pada pasien *skizofrenia paranoid* sesudah diterapkan strategi pelaksanaan halusinasi dengar; (4) Terdapat perbedaan kemampuan mengontrol halusinasi dengar sebelum dan sesudah diterapkan strategi pelaksanaan halusinasi dengar pada pasien *paranoid* halusinasi dengar di RSJD dr. Arief Zainudin Surakarta ( $t_{hit} = 3,521$ ;  $p = 0,002$ ).

**Kesimpulan:** Terdapat pengaruh penerapan strategi pelaksanaan terhadap kemampuan mengontrol halusinasi dengar pasien *paranoid* halusinasi dengar di RSJD dr. Arief Zainudin Surakarta.

**Kata kunci:** Strategi pelaksanaan, Kemampuan mengontrol halusinasi dengar, *skizofrenia paranoid*.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta.

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta.

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sahid Surakarta.

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF REALIZATION STRATEGY IMPLEMENTATION TOWARDS HEARING HALLUCINATION CONTROL ABILITY OF HEARING HALLUCINATION PARANOID PATIENTS AT DR. ARIEF ZAINUDDIN SURAKARTA PSYCHIATRIC HOSPITAL**

*Joni<sup>1</sup>, Atik Aryani<sup>2</sup>, Rif Atiningtyas H<sup>3</sup>*

**Background Study:** Hearing hallucination was one of mental treatment problem which the patients feel fake sensor like an unreal sound. There are 70% schizophrenic patients who experience hearing hallucination. The realization strategy implementation is one of the nursing interventions which is aimed to control patients' hearing hallucination.

**Purpose:** To know the effected of realization strategy implementation towards hearing hallucination control ability of hearing hallucination paranoid schizophrenic patients at dr. Arief Zainuddin Surakarta Psychiatric Hospital.

**Method:** This research belongs to quasy experiment research with time series design. The setting of place is in Nakula and Sena ward at dr. Arief Zainuddin Surakarta Psychiatric Hospital. There are 22 patients as sample with total sampling technique. The researcher used paired simple t-test as analytic instrument.

**Result:** (1) Before the realization strategy implementation, most of hearing hallucination control ability of paranoid schizophrenic patients have the ability to control the hallucination. There are 13 patients (59,1%), and those who do not have the ability to control are 9 patients (40,9%); (2) After the implementation, hearing control ability of paranoid schizophrenic patients who have the ability to control are 16 patients (72,7%); (3) Hearing hallucination control ability of paranoid schizophrenic patients after the implementation of hearing hallucination realization strategy; (4) There are differences in the ability to control hearing hallucination on the pre and post hearing hallucination realization strategy implementation at dr. Arief Zainuddin Surakarta Psychiatric Hospital. ( $t = 3,521$ ;  $p = 0,002$ )

**Conclusion:** There was effect on the hearing hallucination control ability of hearing hallucination paranoid schizophrenic patients at dr. Arief Zainuddin Surakarta Psychiatric Hospital.

**Keywords:** Realization strategy, Hearing hallucination control ability, paranoid schizophrenia.

---

<sup>1</sup>Nursing Department Student of Sahid Surakarta University.

<sup>2</sup>Nursing Department Lecture of Sahid Surakarta University.

<sup>3</sup>Nursing Department Lecture of Sahid Surakarta University.